

METASTASIS EN CAVIDAD ORAL

AUTORES: Córdoba Puga, Emiliana; Fernández Larrota, Gustavo Adolfo; López, Marcelo Alberto; Jañez, María Lujan
Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos San Juan de Dios, La Plata, orlsjdd@gmail.com, Tel: (0221) 4575454

ANTECEDENTES:

- Las metastásis en cavidad representan el 1% de los tumores de cyc,
- El orden de frecuencia es: lengua (27%), encía (17%), glándulas salivales (16%), piso de boca (13%) y el 27% otros.
- Los tumores que metastatizan a boca son pulmón, mama y riñón. Las metástasis indica un mal pronóstico, con una supervivencia corta para el paciente.
- Solo el 15% de los casos son detectados en estadios tempranos.
- FR: sexo masculino (2:1), tabaco y coinfección con HPV.

OBJETIVOS:

*Incidencia de metastásis en cavidad bucal.

*Cuáles son los tipos más frecuentes

DISEÑO:

Revisión bibliográfica
Reporte de casos.

Criterios de inclusión

mayores de 15 años
cáncer secundario en cavidad bucal

Criterios de exclusión

no comprendían el lenguaje
cáncer primario en boca
menores de 15 años
pacientes inmunocomprometidos



N=4

- Biopsia histopatológica
- 1 células claras renales
- 3 carcinoma epidermoide

CONCLUSION:

En base al material bibliográfico y la experiencia en la práctica, hemos constatado que las metastásis bucales son menos 1%, y la estirpe más frecuente el carcinoma epidermoide

