

Epiglotitis de posible etiología gastroesofagica: reporte de un caso

Autores:

Dr. Valdano, Jorge; Dr. Atuch, Nicolás; Dr. Martinez, David; Dr. Monsalve, Santiago



Contexto

La laringitis por reflujo es un trastorno de la voz que resulta de la irritación y posterior edema de las cuerdas vocales debido al reflujo de los fluidos del estómago hacia la garganta. Estos contienen ácidos y enzimas que ayudan a digerir los alimentos en el estómago, pero causan problemas en otras partes del esófago, garganta y laringe. Los síntomas clásicos de ERGE incluyen acidez estomacal. Los signos indirectos del reflujo pueden ir desde un carraspeo hasta sensación de un nudo en la garganta y ronquera.

OBJETIVO

Describir una situación poco frecuente de epiglotitis en adulto.
Enfatizar la importancia de uso del videorinofibrolaringoscopio.

Lugar de aplicación

Instituto Superior de Otorrinolaringología.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Resultados

Paciente consulta por sensación de opresión laríngea, disfonía y demás signos indirectos de reflujo de 1 mes de evolución que se había intensificado los últimos 5 días con esporádico esputo sanguinolento y sensación de falta de aire. Como antecedente tiene una hernia de hiato. Al examen físico sin particularidades. Tiene una VEDA reciente donde se observa metaplasia en la zona de transición esofagogastrica. Se pide una videorinofibrolaringoscopia por el tiempo de evolución, la cual demuestra una epiglotitis de probable etiología de reflujo.



Conclusiones

Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales de la disfonía los cuales pueden ser funcionales u orgánicos. Por la profesión de la paciente lo mas sensato era pensar algún nódulo o polipo de cuerda vocal.
Hay que saber que ante cualquier signo o síntoma laríngeo que permanezca mas de 3 semanas de evolución, es menester pedir una videorinofibrolaringoscopia para su correcto estudio.

Diseño

Estudio descriptivo, observacional.
Reporte de caso.

Población

Paciente de sexo femenino oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 51 años de edad. Cantante de profesión.

Métodos

História clínica, examen físico, estudios por imágenes (Rx, TC) Videorinofibrolaringoscopia.

-Rodríguez-Rodríguez M, et al. Epiglotitis aguda en el adulto. Semergen. 2017

-Lam et al. Adult Acute epiglottitis airway risk. Hong Kong j. emerg. Med. Vol. 16(4) Oct 2009