

# MANEJO DE FÍSTULA PERILINFÁTICA ASOCIADA A OTITIS MEDIA CRÓNICA CON HIPOACUSIA Y VESTIBULOPATÍA CONTRALATERAL

Isobe Elena Maiumi; Cottini María Agustina; Femia Paola; Torréns Sebastián



## INTRODUCCIÓN

-Fístula perilinfática (FPL): Comunicación anormal del oído interno con el oído medio.  
-Incidencia de 1.5/100.000 adultos.

Causas: Cirugía otológica previa, TEC, OMC y barotrauma.

## OBJETIVOS

- Describir el manejo diagnóstico y terapéutico de FPL en paciente con OMC.
- Plantear el compromiso vestibulococlear contralateral como desafío quirúrgico en FPL.

## REPORTE DE CASO



50 años

Otorrea serosa OD  
Acufeno agudo ipsilateral  
Mareos e inestabilidad




AQ: Mastoidectomías bilaterales por OMC  
colestomatosa + Implante osteointegrado OI

## Examen Físico

Nistagmo horizontal a derecha evocado ante cambios de presiones




Cavidad radical húmeda OD




Huellas quirúrgicas libres  
Sin signos de fístula

## Exploración OD bajo monitoreo del VII



Cavidad radical seca OD



## CONCLUSIONES

- Sospechar FPL en pacientes con síntomas vestibulococleares, con antecedentes de cirugía otológica y OMC.
- Se realizó cierre inmediato de FPL, teniendo en cuenta las alteraciones **vestibulococleares contralaterales**, con resultados satisfactorios y adecuada respuesta a la rehabilitación vestibular.