

Roncoli Valentín; Esper Zamar Claudia; Simoncelli Manuel; Garcia Pita Elian

**Antecedentes:** Es una enfermedad de transmisión sexual causada por *Treponema Pallidum*. Su período de incubación promedio es de 2 a 3 semanas, con un rango entre 10 y 90 días. Se transmite fundamentalmente por contacto sexual. La transmisión es mayor en estadios primario y secundario.

**Objetivo:** 

Describir la importancia de considerar a la infección sífilítica como causante de lesiones bucofaringéas.



**Descripción de casos:** faringoamigdalitis exudativa (1), lesión lingual dolorosa, papular y ulcerada (2), lesión labial superior e inferior, dolorosa, papular y ulcerada (3a y b), lesión papular blanquecina indolora de encía inferior izquierda (4), lesión ulcerada tipo nodular cubierta por fibrina en punta de lengua del lado izquierdo (5), lesión ulcerada cubierta de fibrina (6).

**Diagnóstico:** Se confirmó mediante pruebas treponémicas (PT) y no treponémicas (PNT).

**Tratamiento:** Todos los casos fueron tratados con penicilina G benzatínica intramuscular con buena respuesta.

**Key points:**

- Sífilis es una enfermedad en ascenso en los últimos años.
- El campo oscuro en lesiones bucofaringéas no es útil, debemos valernos de PT y PNT.
- Considerar sus manifestaciones bucofaringéas para lograr diagnóstico oportuno.
- Educar a los pacientes con los cuidados de contagio para ETS para disminuir los casos de sífilis.