

PRESENTACION DE CASO
Dra. Valencia CM; Dr Ortiz L; Dr Riolfi N.

Definición: estenosis bilateral en el área media de la cavidad intranasal, por crecimiento excesivo y desigual de las paredes laterales o del tabique, se logra avanzar una fibra óptica flexible mas allá del extremo anterior del cornete inferior, sin visualizar el cornete medio, a pesar de la ausencia de desviación septal; Confirmación TC.

Objetivo:

Describir un caso de atresia de tercio medio nasal en un adulto y su resolución quirúrgica. Se cuenta con poca bibliografía de atresias no coanales en adultos.

Presentación de caso:

Mujer, 37 años, signos y síntomas de IVN, respiración bucal, recibió tto corticoide intranasal. APP: AOS (CPAP), Sx Prader Willi (obesidad, déficit cognitivo), HTA, DBT.

Endoscopia nasal prequirúrgica:



Tomografía:



Conclusiones:

La atresia de tercio medio nasal es una causa infrecuente de obstrucción nasal en adultos. La bibliografía es insuficiente y poco específica. Este caso representa una atresia de tercio medio nasal verdadera. Se requiere endoscopia nasal y TC para su diagnóstico. La CERS es un alternativa eficaz y segura.

Diagnóstico Presuntivo:

- Atresia de tercio medio nasal
- Agenesia tercio anterior del septum nasal

Plan terapéutico:

- Cirugía endoscópica rinosinusal (CERS)

Endoscopia nasal postquirúrgica:

