



Características clínico-demográficas y factores de riesgo asociados con el VPPB.

Dra. Trejo Andrea, Dra. Maccaroni Florencia, Dra. Tieso María Fernanda, Dra. Córdoba Laura.

Servicio de otorrinolaringología - H.I.G.A. Eva Perón de San Martín, Buenos Aires.




Objetivos: Describir las características clínico-demográficas e identificar los factores de riesgo asociados con la ocurrencia de VPPB en el H.I.G.A. Eva Perón.

Introducción: El VPPB es el trastorno vestibular periférico más común. El canal semicircular posterior es el más afectado (60-90%). Se asocian factores de riesgo como edad avanzada, género, deficiencia de vitamina D, HTA, dislipidemia, migraña y DM.


Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo (junio de 2023 - mayo de 2024). Análisis de variables clínico-demográficas y factores de riesgo asociados mediante la revisión de historias clínicas.

Resultados: Muestra compuesta por 128 pacientes diagnosticados con VPPB.

Variable	n (%)
Género (♀)	96 (75)
Edad promedio (años)	57 (16-89)
Sesiones (promedio)	1.8
Recurrencia	17 (13)
Oído derecho	69 (54)
HTA	51 (41)
Migraña	29 (23)
Dislipidemia	20 (16)
DM	15 (12)
Osteoartritis	7 (6)
ACV	6 (5)
Post traumático	10 (8)
Insuficiencia de vitamina D (<30 ng/ml)	90 (70)



Dosaje de vitamina D



Conclusión: En la población, el VPPB afectó predominantemente a mujeres de la tercera edad, siendo el canal posterior el más afectado. Factores de riesgo más relevantes: Deficiencia de vitamina D, HTA, migraña y dislipidemia.