

INTRODUCCION

El papiloma invertido (PI) es una neoplasia benigna que afecta fosas nasales y senos paranasales el cual es localmente agresivo, potencialmente recurrente y con tendencia a la malignización.

PROCEDIMIENTOS

Cirugia endoscopica risinosusal (CERS) + biopsia

Craneotomía por abordaje bicoronal + CERS para resección de tumor por tecnica centripeta

Biopsia: 15/08/24

- Papiloma Schneideriano invertido (HFA)
- CE in situ a descarta mayor compromiso por ser un tumor superficial (Diagnostico Maipú)

Biopsia 26/09/24

- Papiloma Schneideriano invertido (HFA)
- PI con focos de displasia (Diagnostico Maipú)

CONCLUSIÓN: El PI es un tumor benigno que presenta un gran potencial invasivo. La invasión intracraneal y orbitaria de esta patología es sumamente infrecuente, pero cuando existe, puede poner en evidencia el potencial de agresividad del tumor por lo que la exéresis completa de la misma define el pronóstico de la enfermedad.

REPORTE DE CASO

Hombre - 73 años, cuadro clínico de aproximadamente 5 años de evolución caracterizado por insuficiencia ventilatoria nasal bilateral de predominio derecho asociado anosmia, rinorrea hialina y cefalea frontal ocasional.

OBJETIVO

Describir el caso clínico de un paciente con PI con presentación agresiva y su resolución quirúrgica.

